

## 아프리카돼지열병(ASF) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

### 1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상  
생석회 충분히 도포



출입구 고정식 + 고압분무기  
2단계 소독



- 1주일 간격 반복 도포
- 비·눈 내린 후 즉시 재도포
- U자형 소독시설인 경우  
고압분무기로 차량의 바퀴와  
하부 등 추가 소독

### 2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)  
매일 청소·소독



※ 소독약은 용법용량  
권장 희석배수 준수

부출입구·뒷문 폐쇄



- 농장 내 야생조수류 유인 요소  
(사료·폐사축 등) 매일 청소·소독
- 방역·소독시설이 설치되지  
않은 농장 부출입구 폐쇄

### 3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기  
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 전용장화 · 손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

### 4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독  
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독  
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이  
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부