

구제역

『특별방역기간』을 잘 넘겨야

구제역 청정화가 가능합니다.



특별방역기간 : '13. 10. 2 ~ '14. 5. 31

1



▶ 농장 내 외부 소독을 매일 하고, 외부인·차량 통제를 철저히 합니다.

2



▶ 특별방역기간에 축산인은 해외여행을 자제합니다

▶ 여행을 하는 경우, 출입국 시 공항만 소재 검역본부에 신고

3



▶ 구제역 예방접종 미 실시 농가는 500만원 이하의 과태료가 부과됩니다.

- 부과대상 : 항체형성률 소 80% 미만, 번식돈 60% 미만, 염소 60% 미만, 비육돈은 항체형성 수준·백신구매·접종기록 등으로 접종여부 확인
- 육성돈은 반드시 예방접종 실시 후 분양해야 합니다.

4



▶ 가축의 소유자 등은 도축장 출하 및 농장 거래시 구제역 예방접종 여부를 반드시 확인해야 합니다.

5



▶ 구제역 최초 발생농장에 대해 피해액에 대한 구상권이 청구 됩니다.

6



▶ 구제역 감염(양성) 농장은 살처분보상금이 80%이하로 지급됩니다.



구제역 의심증상 발견시

1588-9060, 1588-4060 으로 신고합니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부

올바르고 철저한 예방접종으로 구제역을 막읍시다.

구제역 예방접종 요령과 프로그램을 준수하셔야 백신효과가 가장 좋습니다.

1 백신접종 전 준비사항

- 겨울철은 예방약을 따뜻하게(20℃~25℃)하여 주사
* 뜨거운 물로 백신을 끓이면 백신 효과가 없어집니다.
- 예방약은 냉장보관 철저(단, 동결방지)



2 축종별 적정 주사침 사용(크기, 길이)

- 주사침 크기 : 16G/18G(소), 18G/19G(성돈, 자돈), 19G/20G(양, 염소)
- 주사침 길이 : (성돈) 1½ 인치, (자돈) 1인치

3 올바른 접종방법

- 피부와 직각으로 접종 : 주사침이 근육 속으로 완전히 들어가게 주사
- 1침 5두 이내로 위생적인 접종 : 1침으로 여러 마리 접종 시 주사침 오염이 심해지고 뭉뚱해져 접종부위가 손상되어 염증으로 이상육이 발생할 수 있습니다.



사용전 주사침



1두 사용 주사침



5두 사용 주사침

* 단단히 보정하여 적정 용량(소·돼지·사슴 : 2mL/두, 염소 : 1mL/두)을 근육부위에 천천히 접종

4 구제역 예방접종 프로그램

축종	백신접종시기	축종	백신접종시기
소	<ul style="list-style-type: none"> ■ 송아지 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차 접종 ■ 모든 소 : 4~7개월 간격으로 접종 	흑돼지·멧돼지	<ul style="list-style-type: none"> ■ 생후 2~3개월령 1차, 1차 접종후 4~7개월 간격으로 접종
돼지	<ul style="list-style-type: none"> ■ 모돈 : 분만 약 1개월(3~4주)이전 접종 ■ 웅돈 : 4~7개월 간격으로 접종 ■ 자돈 : 2~3개월령 1차만 접종 (분양전 예방접종) *비육돼지는 8주령에 접종하여야 백신효과가 가장 좋습니다. ■ 종돈장의 자돈중 암컷(후보모돈 예정) 2개월령 1차, 1개월후 2차 접종 	염소	<ul style="list-style-type: none"> ■ 어린 염소 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차, 2차 접종 4~7개월 후 보강 ■ 1세 이상 염소 : 1년 간격으로 접종
		사슴	<ul style="list-style-type: none"> ■ 어린 사슴 : 2개월령 1차, 1개월 후 2차 접종 ■ 모든 사슴 : 4~7개월 간격으로 접종



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부